

Poruchy embryonálního vývoje tkání

Poruchy embryonálního vývoje tkání jsou:

- **Hamarcie** - chybné zapojení tkáně, ale místně odpovídající. Příkladem je plicní chondrohamartom nebo vznik kožních névů.
- **Choristie** - zavlečení tkáně během embryonálních přesunů do míst, kde se fyziologicky nevyskytuje, např. zbloudilé žlázové okrsky ve svalovině střeva (tzv. adenomyomy), kůra nadledviny pod pouzdrém ledviny, pankreatická tkáň pod sliznicí tenkého střeva (**Saltykovův karcinoid**).

Odkazy

Zdroj

- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 2010]. <<https://langenbeck.webs.com/>>.

Článek neobsahuje vše, co by měl.



Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Poruchy_embryon%C3%A1ln%C3%ADho_v%C3%BDvoje_tk%C3%A1n%C3%AD&action=history) a doplnit (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Poruchy_embryon%C3%A1ln%C3%ADho_v%C3%BDvoje_tk%C3%A1n%C3%AD&action=edit) jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Poruchy_embryonálního_vývoje_tkání&oldid=416032“