

# Granuloma inguinale

**Granuloma inguinale** (známá též jako **donovanóza**) je pohlavně přenosné onemocnění vředového charakteru. Způsobené bakterií *Klebsiella granulomatis* (dříve zvaná *Donovania*, pak *Calymmatobacterium granulomatis*). Vyskytuje se hlavně v tropech a subtropích.

## Klinický obraz

Projevuje se jako plazivý vřed s hypertrofickou spodinou. Při progresi onemocnění se šíří do okolí, jizví a způsobuje mutilace postižených oblastí.

## Léčba

Doxycyklin, erytromycin po 2 týdny. Léčba vede ke zhojení.

## Odkazy

### Související články

- Syfilis
- Vrozená syfilis
- Rychlá reaginová reakce
- TPHA
- Chancroid
- Lymphogranuloma venereum
- HIV
- AIDS

### Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.

Donovanóza	
Granuloma inguinale	
	
<b>Původce</b>	bakterie <i>Klebsiella granulomatis</i>
<b>Přenos</b>	pohlavním stykem
<b>Inkubační doba</b>	1-12 týdnů
<b>Infekčnost</b>	vysoká na západě Nové Guineji, střední Austrálii, karibské oblasti, Africe
<b>Léčba</b>	antibiotika
<b>Klasifikace a odkazy</b>	
<b>MeSH ID</b>	D006100 ( <a href="https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=D006100">https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=D006100</a> )