

# Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 17

## 1 Komorová tachykardie

- je synonymem pro sinusovou tachykardii
- je závažnou arytmií vyžadující intenzivní léčbu a monitorování
- může přejít do fibrilace komor
- je běžná arytmie vyskytující se občas i u zdravých lidí

## 2 Mezi rizikové faktory, které při akutní ischemii myokardu přispívají ke vzniku fibrilace komor, patří

- vagová reakce se zvýšeným působením parasymptiku na myokard
- vznik krouživého impulsu (reentry fenomén) v ischemické tkáni
- zvýšený tonus sympatiku, navozený stresovou reakcí
- úplná atrioventrikulární blokáda převodu vzruchu

## 3 Mezi rizikové faktory fibrilace síní patří

- hypothyreóza
- hypokalémie
- hypertyreóza
- ischemická choroba srdeční

## 4 Mezi rizikové faktory vzniku fibrilace síní patří

- stenóza mitrální chlopně
- hypomagnesémie
- atrioventrikulární blokáda II. stupně
- Adams-Stokesův syndrom

## 5 Mezi syndromy preexcitace patří

- syndrom dlouhého QT intervalu
- Wenckebachovy periody
- Wolf-Parkinson-Wjiteův syndrom
- sick-sinus syndrom

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Portov%C3%A1%20patofyziologie\\_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho\\_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_16](https://www.wikiskripta.eu/w/Portov%C3%A1%20patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_16))

Zpět na obsah ([https://www.wikiskripta.eu/w/Portov%C3%A1%20patofyziologie\\_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho\\_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_17](https://www.wikiskripta.eu/w/Portov%C3%A1%20patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_17))

Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Portov%C3%A1%20patofyziologie\\_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho\\_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_18](https://www.wikiskripta.eu/w/Portov%C3%A1%20patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_18))

Našli jste chybu? Napište!