

Srdeční vír

Srdeční vír je palpační ekvivalent srdečního šelestu.

Srdeční vír hledáme v prekordiu a v jugulární jamce. Na rozdíl od úderu hrotu má delší trvání. Vzniká přenosem vibrací, které jsou zdrojem srdečního šelestu, na povrch hrudníku. Je hmatný při intenzitě šelestu minimálně 4. stupně (4/6).^[1]

Odkazy

Související články

- Vibrační šelest
- Pulmonální vypuzovací šelest
- Vířivý žilní šelest

Reference

1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. *Preklinická pediatrie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 120. ISBN 978-80-7262-438-6.

Článek neobsahuje vše, co by měl.



Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Srde%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%ADr&action=history) a doplnit (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Srde%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%ADr&action=edit) jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Srdeční_vír&oldid=288760“