

Krevní transfuze

Indikace podání krevních derivátů

- Anémie (obvykle při hemoglobinu pod 80 g/l s manifestním anemickým syndromem),
- těžká trombocytopenie,
- některé imunodeficience,
- hemofilie a některé další koagulopatie.


Druhy transfuze

- **Alogenní transfuze** - využití krevních produktů jiných lidí.
- **Autologní transfuze** - pacientova vlastní uschovaná krev při plánovaných operacích (menší riziko infekce).

Krevní produkty používané při transfuzích




























- **transfuzní přípravky** (připravovány na místní transfuzní stanici)
 - plná krev,
 - erymasa (červené krvinky),
 - plazma neboli čerstvě zmražená plazma,
 - krevní destičky - (*tyto 3 frakce lze získat z plné krve centrifugací*),
- **krevní deriváty** (dodávají farmaceutické firmy z masově zpracované plazmy)
 - albumin,
 - kryoprecipitát (*připravuje se z krevní plazmy kryoprecipitací - t.j. „vymrznutím“ - některých proteinů; obsahuje f. VIII, fibrinogen, von Willebrandův faktor, f. XIII; možné použití např. při hemofilii, von Willebrandově chorobě, hypofibrinogémii*),
 - koncentráty srážecích faktorů,
 - koncentrát fibrinogenu,
 - imunoglobuliny.

Krevní skupiny

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Krevní skupiny.*

Nejdůležitější a nejznámější krevní skupiny patří do **systému AB0** (inkompatibilita způsobuje potransfuzní hemolýzu; protilátky systému AB0 jsou třídy IgM a jsou tedy dostatečně velké aby mohly způsobovat aglutinaci - shlukování erytrocytů). Dalším důležitým typem krevních skupin je **Rh faktor** (negativita matky z hlediska tzv. antigenu D - t.j. Rh faktoru - a pozitivita dítěte může způsobit hemolytickou nemoc novorozenců). Na povrchu červených krvinek se však vyskytuje více než třicet různých skupin variabilních antigenů, tzn. že můžeme hovořit o více než třiceti typech (systémech) krevních skupin. *Příklady: MNS systém, kdy zvláště přítomnost anti-S protilátek u příjemce může způsobit potransfuzní hemolýzu. Systém antigenu Kell (inkompatibilita může způsobit autoimunní hemolytickou anémii a hemolytickou nemoc novorozenců).* Přítomnost plazmatických protilátek proti těmto antigenům (jiným než systémů AB0 a Rh) je **vzácná**, avšak pokud se objeví, může způsobit vážné potransfuzní reakce. Tyto protilátky označujeme jako **nepravidelné protilátky**.

Kompatibilita krevních skupin systémů AB0 a Rh

		Dárce							
		0-	0+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
Příjemce	AB+								
	AB-								
	A+								
	A-								
	B+								
	B-								
	0+								
	0-								

Předtransfuzní vyšetření prováděná v laboratoři

1. Vyšetření krevních skupin **AB0 a Rh systému** jak u **dárce**, tak u **pacienta / příjemce**.
2. Screening séra **příjemce** na přítomnost **nepravidelných protilátek**. *To se děje smícháváním séra pacienta se standardizovanými směsmi erytrocytů, které mají na svém povrchu veškeré známé nepravidelné antigeny (tzv. nepřímý Coombsův test). Aglutinace znamená přítomnost nepravidelných protilátek v séru příjemce a vyznačuje si detailnější testování zaměřené na identifikaci nepravidelných protilátek v séru příjemce i dárcovských krvinek.* Screening se provádí každý den, ve kterém je prováděna transfuze, protože nepravidelné protilátky se mohou objevit jako reakce na předchozí transfuzi.
3. **Velká křížová zkouška. Červené krvinky dárce** jsou testovány proti **plazmě příjemce**. Pokud se objeví aglutinace, znamená

to přítomnost protilátek v séru proti antigenům na povrchu červených krvinek. Aglutinace znamená inkompatibilitu krevní skupiny a daného pacienta. Nepřítomnost aglutinační reakce je předpokladem pro podání transfuze.


4. **Screening na infekční onemocnění.** Řada infekčních onemocnění je přenositelná transfuzí. Proto se provádí screening potenciálních rizikových faktorů a laboratorní testování dárce na některá infekční onemocnění (HIV, hepatitis A, B a C, treponema pallidum, malárie, cytomegalovirus aj.).

Testování u lůžka pacienta

1. Vyšetření **příjemce před transfuzí.** Měří se teplota, krevní tlak, pulz. Dále se provádí orientační vyšetření moči.
2. **Kontrola dokumentace** u lůžka příjemce. Kontrolujeme, zda souhlasí údaje na žádance a krevní konzervě a zda nedošlo k záměně příjemce.
3. **Kontrola krevních skupin dárce a příjemce u lůžka příjemce:**

Provádí se pomocí diagnostických souprav různých výrobců. Souprava obsahuje séra anti-A (obvykle obarvené modře) a anti-B (žluté), předtištěné karty a plastové tyčinky na promíchání vzorku krve s antisérem. Karta se označí identifikačními údaji příjemce a krevní konzervy. Do červených kroužků se nanese kapky krve příjemce a vzorky z krevní konzervy (odebírá se ze „segmentu“ na hadičce konzervy). Do modrých a žlutých koleček se kápnou séra anti-A a anti-B (antiséra má být ve srovnání s množstvím krve nadbytek). Krev se promíchá a za 1 minutu se při opatrném naklánění karty odečítá aglutinace (viz tabulku).

4. **Biologický pokus.** Asi 20 ml (asi 300 kapek) krve se pustí do žíly proudem a potom se na 1 až 2 min zpomalí na minimum. Neprojevili-li se u nemocného nepříznivé reakce, zkouška se ještě 2x opakuje. Během celého pokusu (10 až 15 min) lékař i sestra příjemce pozorují. (Biologická zkouška se dle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP již **neprovádí**).



Karta pro kontrolu krevní skupiny u lůžka

Určení krevní skupiny pomocí aglutinace s antiséry

Shlukování nastalo:	Skupina dárce a příjemce
se sérem anti-A	A
se sérem anti-B	B
s anti-A i anti-B	AB
nenastalo nikde	0

- Sestra pak pokračuje ve sledování po celou dobu transfuze. Při zjištění subjektivních potíží nebo objektivního zhoršení stavu, ihned zastaví přívod jezdcem (jehlu nechá v žíle) a neprodleně uvědomí lékaře. Transfuzi sestra ukončuje ve chvíli, kdy ve vaku zůstává 10 ml krve. Příjemci změří tep, dech, TK, TT, popř. vyšetří moč (na bílkovinu a žlučová barviva). Hodnoty opět zapíše a přidá i časový údaj, kdy transfuze skončila. Konzervu se zbytkem krve uloží do chladničky na 24 hodin (opatření pro případ dodatečné kontroly krve při pozdní potransfuzní reakci).
- Výměna krevních konzerv - každá konzerva je podána novou sterilní převodovou soupravou, z původního převodu může zůstat v žíle původní jehla, u každé konzervy má být znovu provedena kontrola krevních skupin sangvitestem a biologická zkouška.

Vitální indikace vzniká, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Křížová zkouška se vyšetřuje orientačně smícháním krví na skličku. Laboratorní testy se dokončí a ověří tak správnost orientačního testu. Biologický pokus se neprovádí.

Možné potransfuzní komplikace

- Akutní hemolytická reakce - vzniká při inkompatibilitě v AB0 systému, zvláště když krev příjemce obsahuje protilátky proti erytrocytům dárce,
- opožděná hemolytická reakce,
- febrilní nehemolytická potransfuzní reakce,
- anafylaktická reakce,
- infekce - HBV, HCV, HIV, Treponema pallidum, CMV, parvovirus B19,
- přetížení organismu železem při opakovaných transfuzích,
- potransfuzní akutní poškození plic (Transfusion Related Acute Lung Injury, TRALI) způsobené leukocyty přítomnými v transfuzi,
- objemové přetížení,
- vznik srdeční arytmie - transfuze netemperované tekutiny cestou centrálního žilního katetru do blízkosti pravé síně,
- potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (Transfusion-associated graft vs. host disease, GvHD) - T-lymfocyty dárce reagují s HLA antigeny příjemce; při transfuzi krve imunokompromitovaným příjemcům nebo při transfuzi od pokrevního příbuzného.

Odkazy

Externí odkazy

- ✿ **AKUTNE.CZ**^{*} Dopravní nehoda Svědků Jehovových - interaktivní algoritmus + test (<http://www.akutne.cz/index.php?pg=vyukove-materialy--rozhodovací-algoritmy&tid=337>)

Související články

- Krevní skupiny
- Výměnná transfuze

Použitá literatura

- NEČAS, Emanuel, Karel ŠULC a Martin VOKURKA. *Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I.* 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 978-80-246-0615-6.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Krevní_transfuze&oldid=439679“