

# Granuloma inguinale

**Granuloma inguinale** (známá též jako **donovanóza**) je pohlavně přenosné onemocnění vředového charakteru. Způsobené bakterií *Klebsiella granulomatis* (dříve zvaná *Donovania*, pak *Calymmatobacterium granulomatis*). Vyskytuje se hlavně v tropech a subtropích.

## Klinický obraz

Projevuje se jako plazivý vřed s hypertrofickou spodinou. Při progresi onemocnění se šíří do okolí, jizví a způsobuje mutilace postižených oblastí.

## Léčba

Doxycyklin, erytromycin po 2 týdny. Léčba vede ke zhojení.

## Odkazy

### Související články

- Syfilis
- Vrozená syfilis
- Rychlá reaginová reakce
- TPHA
- Chancroid
- Lymphogranuloma venereum
- HIV
- AIDS

### Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.

Citováno z „[https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Granuloma\\_inguinale&oldid=421478](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Granuloma_inguinale&oldid=421478)“

## Donovanóza

Granuloma inguinale



**Původce** bakterie *Klebsiella granulomatis*

**Přenos** pohlavním stykem

**Inkubační doba** 1-12 týdnů

**Infekčnost** vysoká na západě Nové Guineji, střední Austrálii, karibské oblasti, Africe

**Léčba** antibiotika

### Klasifikace a odkazy

**MeSH ID** D006100 (<https://www.medvik.cz/link/D006100>)