

# Karcinom Vaterovy papily

**Karcinom Vaterovy papily** (*ampulom*) je vzácnějším tumorem, tvoří 1,5 % tumorů GIT, jedná se hlavně o **adenokarcinom**. Vyrůstá ze sliznice distálního choledochu, pankreatického vývodu, vlastní ampuly.

## Klinický obraz

- Nebolestivý ikterus (i intermitentní) + obraz cholestázy,
- ataka pankreatitidy / cholangitidy,
- bolesti v epigastriu s propagací do zad, průjmy,
- příznaky duodenální obstrukce,
- játra zvětšená, může být hmatný žlučník (Courvoisierův příznak),
- trombóza v. portae + vznik ascitu.

## Diagnostika

- Endoskopie s odběrem biopsie (kličkou),
- ERCP, PTC, USG,
- laboratorně: obraz cholestázy, ↑ AMS, ikterus může kolísat, CA 19-9.

## Terapie

- Chirurgická - resekce nádoru + rekonstrukce žlučových cest (ŽC) - **duodenopankreatektomie** (Whippleova operace),
- u benigního tumoru resekce papily s reimplantací žlučovodu, příp. i pankreatického ductu.

## Prognóza

- Lepší než u ostatních tumorů ŽC (při radikálním výkonu 5leté přežití až u ½ pac.),
- dobré výsledky - protože velmi záhy způsobí obstrukci a symptomy.

## Odkazy

### Použitá literatura

- KLENER, P, et al. *Vnitřní lékařství*. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.

Citováno z „[https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Karcinom\\_Vaterovy\\_papily&oldid=358781](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Karcinom_Vaterovy_papily&oldid=358781)“