

Dirofilarióza

Dirofilarióza je onemocnění způsobené *Dirofilaria repens* či *Dirofilaria immitis*. Jsou to tenčí bílí červi a patří mezi filárie. Běžně napadají **šelmy**, hlavně psovitě a kočkovitě. Člověk je **náhodný hostitel**, ve člověku larva nedospěje. Zdrojem infekce je komár (vektor).

Dirofilariózy patří k tzv. **nově hrozícím infekcím** („emerging infectious diseases“). Jde o infekční onemocnění, jejichž šíření je pozorováno **celosvětově** a je známo, že často úzce souvisí s cestováním lidí, přemísťováním zvířat a s globálními klimatickými změnami, zejména oteplováním. ^[1]

Životní cyklus

Larvy se vyvíjí v komárovi 15–18 dní. Jakmile komár kousne člověka, larvy se dostávají do kůže a z ní do krve. Larvy v člověku nedospívají v dospělé, ale uhnízdí se v některém orgánu, kde **vytvorí noduly**. Nejčastěji napadnou podkoží, plíce, srdce nebo oči. Mohou se také zachytit lymfatických uzlinách a v dutině břišní.

Klinické příznaky

Dirofilaria repens

- V ČR je častější než *Dirofilaria immitis* (v ČR jen 5 případů, ale stále se rozšiřuje a blíží se k Česku z klasických míst výskytu).
- Nejčastější původce symptomatické dirofilariózy. ^[1]
- Při nakažení člověka vytváří noduly v kůži, v oblasti orbity, ve sklivci, spojivce a na víčku.

Dirofilaria immitis

- Česky **vlasovec psí**.
- Často se mu říká **srdceční červ**, neboť se velmi rád usidluje v srdci a způsobuje kardiopulmonární poškození (u psa).
- U člověka i u psa však nejčastěji způsobuje **asymptomatické infekce**. ^[1]
- U člověka se larva nejčastěji zachytí v podkoží, oku nebo v plicích, kde vytváří noduly.

⚠ Infekce dirofiláriemi mohou vyvolat poměrně **silnou imunitní odpověď** a ta může souviset s některými dalšími příznaky lokalizovanými mimo postižené místo. ^[1]

Diagnostika

- **Mikroskopické vyšetření** odebraných tkání (biopsie, excize).
- Detekce specifických protilátek (sérum, sklivec) či DNA parazita.

Terapie

- **Antihelmintika** (ivermektin, dietylkarbamazin), která poškozují svalovinu červa. ^[1]
- Chirurgické odstranění červa.

Prevence

Pravděpodobně bude případů dirofilariózy přibývat kvůli šíření samotného parazita i kvůli stále rostoucímu cestování lidí spolu s domácími mazlíčky (psi a kočky). Cestovatelé by se měli chránit před komáry i v nemalariických oblastech. ^[1]

Odkazy

Související články

- Filárie
- Loaóza
- Onchocerkóza

Reference


1. DITRICH, O.. *Případ dirofilariózy importované z Řecka (Stručný úvod do problematiky dirofilarióz u lidí a kazuistika případu)*. Příspěvek na konferenci Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější. Praha. 7. dubna 2009. Dostupné také z <<http://www.parazitologie.cz/akce/doc/sbornik/sbornik.pdf>>.

Použitá literatura

- CHANOVÁ, Marta. *Nákazy vyvolané hlísticemi III (Filárie)* [přednáška k předmětu Parazitologie, obor Všeobecné lékařství, 1.


***Dirofilaria repens* a
*Dirofilaria immitis***

Secernentea
Onchocercidae




Dirofilaria immitis (vlevo) a
Dirofilaria repens (vpravo)

Výskyt	kosmopolitní
Onemocnění	dirofilarióza
Infekční stadium a způsob nákazy	mikrofilárie, bodnutí nakaženého komára
Diagnostika	mikroskopie
Terapie	ivermektin, dietylkarbamazin
MeSH ID	D004182 (https://www.medvik.cz/link/D004182)



Životní cyklus *Dirofilaria repens*



Oční dirofilarióza způsobená *Dirofilaria repens*

Citováno z „<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Dirofilarióza&oldid=387139>“