

Hypermagnesémie


Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Jako **hypermagnesémii** označujeme hodnotu hořčíku $> 1,0$ mmol/l. Hypermagnesémie je u dětí raritou a zvýšená magnesémie by mohla být při renálním selhání, insuficienci nadledvin a u novorozenců, jejichž matky byly léčeny před porodem solemi hořčíku pro eklampsii. U novorozenců projev spočívají ve svalové hypotonii, snížení šlachookosticových reflexů, bradykardii, apnoe a v opožděném vyprazdňování smolky.

Terapie

Léčba většinou není třeba. Zastavíme přívod hořčíku. V závažných případech podáváme 10% Calcium gluconicum (1 ml = 0,2 mmol) 0,5 až 1,0 ml/kg nebo 10% Calcium chloratum (1 ml = 1 mmol) 0,1 až 0,2 ml/kg i.v. během 10 minut (maximální jednotlivá dávka je 10 mmol). Současně kontrolujeme srdeční frekvenci (při rychlém podání je riziko bradykardie).

Další možností je podání furosemidu 1 mg/kg i.v. nebo kortikoidů (prednison 1 mg/kg). V extrémním případě hemodialýza.



Hypermagnesémie (video v angličtině)

Odkazy

Externí odkazy

- Hypermagnesémie a EKG (TECHMED) (<https://www.techmed.sk/hypermagnezemia-hypomagnezemia/>)

Zdroj

- HAVRÁNEK, Jiří: *Dysbalance magnesia*. (upraveno)

Související články

- Hypomagnesémie
- Hořčík

Citováno z „<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Hypermagnesémie&oldid=451174>“