Meralgia paraesthetica

Meralgia paraesthetica je úžinový syndrom, při kterém dochází ke kompresi ***n. cutaneus femoris lateralis*** (z *plexus lumbalis*) při jeho průběhu z pánve pod *ligamentum inguinale*. Vyskytuje se častěji u obézních lidí, těhotných žen a diabetiků.

Červeně oblast zásobení *n. cutaneus femoris lateralis*

Projevy

Projevuje se **intenzivními pálivými bolestmi** a parestéziemi na zevní straně stehna. V této oblasti může být i porucha čití.

Bolesti se typicky zmírňují při flexi v kyčli.

Léčba

Základním opatřením je snížit tělesnou hmotnost. Dále se provádí se obstřiky lokálními anestetiky a kortikosteroidy. Mohou se podávat léky na léčbu neuropatických bolestí (karbamazepin, amitriptylin).

Při trvání problémů je indikována **chirurgická léčba** – uvolnění nervu. Její výsledky jsou často neuspokojivé[zdroj?].

Odkazy

Související články

- Obezita
- Diabetes mellitus
- Úžinové syndromy

Externí odkazy

- Meralgia paraesthetica – Mayo Clinic (https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meralgia-paresthetica/symptoms-causes/syc-20355635)

Převzato z

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2010]. <http://www.jirben.wz.cz/>.

Použitá literatura

- AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie.* - vydání. Galén, 2006. 351 s. ISBN 9788072624331.