

# Kordocentéza



Článek byl doporučen ke studiu

×

Tento článek doporučil ke studiu pedagog lékařské fakulty:



MUDr. Antonín Šípek -- redakce WikiSkript

*Zjednodušili jsme význam „zelené fajfky“! Více se dozvíte v tomto článku.*



**Kordocentéza** (CC, punkce pupečnicku) je **invazivní** metoda využívaná v rámci prenatální diagnostiky. Vyšetření lze provádět až relativně později – obecně **od 18. gestačního týdne**<sup>[1]</sup>. Punkce pupečnicku a odběr fetální krve z pupečnickové vény se provádí speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolu. Získané krevní elementy (lymfocyty plodu) lze užít k **vyšetření karyotypu** plodu či pro **molekulárně genetické vyšetření** s cílem vyloučit u plodu chromozomální aberace či geneticky podmíněné choroby. Karyotypizace lymfocytů plodu je velmi rychlá, výsledky jsou k dispozici během 48–72 hodin<sup>[1]</sup>. Krev plodu je cenným diagnostickým materiálem, který lze mimo jiné použít ke stanovení krevní skupiny plodu, diagnostice aloimunizace plodu, infekce plodu či k diagnostice některých dědičných chorob a poruch (např. hemoglobinopatie)<sup>[1]</sup>.

Riziko výkonu je ve zkušených rukách srovnatelné s rizikem amniocentézy (pod 1 % fetálních ztrát)<sup>[1]</sup>.

## Odkazy

### Související články

- Klinická genetika
- Prenatální diagnostika
- Amniocentéza
- Odběr choriových klků
- Indikace chromosomálního vyšetření

### Reference

- CALDA, Pavel, et al. *Ultrazvuková diagnostika v těhotenství: pro praxi*. 1. vydání. Praha : Aprofema, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903706-1-6.

Citováno z „<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Kordocentéza&oldid=421754>“