

# Obsedantně kompulzivní porucha

**Obsedantně kompulzivní poruchy** (*obsessive-compulsive disorders, OCD*) jsou velmi časté úzkostné poruchy, pro které jsou charakteristické tzv. vtíravé myšlenky (vlastní, nechtěné, opakující se myšlenky, **obsese**) a/nebo nutková opakující se jednání (**kompulze**).

*Pacient po opuštění bytu začíná přemýšlet, jestli opravdu zamknul, zhasnul, či vypnul plynový vaříč. Pociťuje napětí, úzkost, obavy - obsese, že nezamknul a někdo ho vykrade; že nezhasnul a elektrika se vznítí; že nevypnul plynový vaříč a plyn vybuchne. Musí se vrátit a vše zkontrolovat. Po zkontrolování (provedení kompulze, rituálu) úzkost mizí. Pacient znovu opouští byt a vše se opakuje. Než odejde do práce, musí se například 17× vrátit a zkontrolovat zamknuté dveře.*

Provedení kompulze (rituálu) úzkost odstraňuje, ale pouze dočasně. Z dlouhodobé perspektivy vede ke vzniku „začarovaného kruhu“ a stupňování úzkosti.

Jedná se o závažné onemocnění, nicméně většina forem OCD je v dnešní době léčitelná. Vzácně se nemoc léčbou nedaří zvládnout, v těchto případech může vést až k invaliditě.

## Epidemiologie

OCD je po depresi **druhým nejčastějším** psychiatrickým onemocněním. Trpí jím 2-3 % populace (tzn. okolo 200 000 lidí v ČR). Manifestuje se většinou kolem 20. roku života. Muži i ženy jsou postiženi stejně často. Podnebí, rasa nebo kulturní zvyklosti nehrají pravděpodobně žádnou roli.

## Příznaky a diagnostika

K tomu, abychom mohli pacientovi diagnostikovat OCD, je zapotřebí:

- aby se u něj symptomy OCD vyskytovaly nejméně po dobu 2 týdnů,
- aby vtíravé myšlenky vnímal jako opakující se, iracionální a narušující jeho duševní pohodu,
- aby vtíravé myšlenky a/nebo nutková jednání nedokázal potlačit a poddání se jim vnímal jako nepříjemné,
- aby vtíravé myšlenky považoval za své **vlastní** myšlenky

(kdyby slyšel hlasy, které mu říkají, že nezamknul a že jej někdo může vykrást, resp. kdyby pacient udával, že se jedná o myšlenky cizí, které jsou mu do hlavy vkládány, pak je třeba diferenciálně diagnosticky pomýšlet na schizofrenii).

## Třídění dle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize

- dělení dle MKN-10: F42 (<https://old.uzis.cz/cz/mkn/F40-F48.html#F42>)

MKN 10	
<b>F42</b>	<b>Obsedantně-nutková porucha</b>
F42.0	Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
F42.1	Převážně nutkové činy (nutkové rituály)
F42.2	Smíšené nutkové myšlenky a činy
F42.8	Jiné obsedantně-nutkové poruchy
F42.9	Obsedantně-nutková porucha, NS

## Léčba

Léčbou první volby je dnes **kognitivně behaviorální terapie**. Pacient je **vystaven situaci**, která u něj vyvolává rozvoj úzkosti, a následně je mu **zabráněno** provedení rituálu/kompulze. Terapie musí být pacientovi „šitá na míru“, vždy postupujeme od pro pacienta jednodušších aktivit ke složitějším.

*Pacient nabyl přesvědčení, že všechny předměty kolem něj jsou pokryty bacíly, a bojí se, že onemocní infekční chorobou (= obsese). Proto jakmile se čehokoliv dotkne holou rukou, musí jít do koupelny a 7,5 minuty si antibakteriálním mýdlem umývat ruce, a to přesně definovanými tahy (= rituál/kompulze). Když je splete, začíná znovu od začátku. Denně si průměrně 5 hodin myje ruce. K psychiatrovi byl odeslán kožním lékařem, kterého navštívil pro dermatitidu umývaných oblastí.*

**Příklad kognitivně-behaviorální terapie:** Pacienta necháme dotknout se „infekčního předmětu“ (např. záchodového prkénka) a následně mu zabráníme v umytí rukou (v provedení kompulze/rituálu). Úzkost, která byla vyvolána dotekem záchodového prkénka, postupně odezní, čímž pacientovi pomůžeme uvědomit si, že ke zbavení

## Obsedantně kompulzivní porucha

Obsessive-compulsive disorder



*Mytí rukou je častou obsedantně kompulzivní poruchou*

**Klinický obraz** vtíravé myšlenky, nutková opakující se jednání

### Klasifikace a odkazy

**MKN-10** F42.9 (<https://old.uzis.cz/cz/mkn/F40-F48.html#F42.9>)

**MeSH ID** D009771 (<https://www.medvik.cz/link/D009771>)

**OMIM** 164230 (<https://omim.org/entry/164230>)

**MedlinePlus** 00929 (<https://medlineplus.gov/ency/article/00929.htm>)

**Medscape** 1934139 (<https://emedicine.medscape.com/article/1934139-overview>)

Dalšími součástmi léčby mohou být

- **Farmakoterapie** (především antidepresiva typu SSRI; v některých případech se preparáty SSRI kombinují s anxiolytiky nebo neuroleptiky).
- **Režimová opatření** (eliminace stresu, relaxace, pohybové aktivity).
- **Neurochirurgie** (cingulotomie; neurochirurgická léčba je přísně indikovaná a využívá se jí pouze u maligních forem OCD).
- **Elektrokonvulzivní terapie** (účinek je přinejmenším diskutabilní).



## Odkazy

### Související články

- Úzkostné poruchy
- Fobické úzkostné stavy
- Duševní hygiena

### Externí zdroje

- Článek Obsedantně kompulzivní porucha ve Wikipedii

### Použitá literatura

- RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. *Psychiatrie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.
- PRAŠKO, Ján, et al. *Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit*. 1. vydání. Praha : Portál, 2003. 115 s. ISBN 80-7178-810-4.
- PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. *Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat*. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 69 s. ISBN 978-80-7262-531-4.
- PIDRMAN, Vladimír. *Obsedantně kompulzivní porucha. Příručka pro lékaře*. 1. vydání. Praha : Galén, 1999. 32 s. ISBN 80-7262-041-X.
- NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH, . *Obsessive-Compulsive Disorder, OCD* [online]. [cit. 2010-03-12]. <<https://www.nimh.nih.gov/health/topics/obsessive-compulsive-disorder-ocd/index.shtml>>.

Citováno z „[https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Obsedantně\\_kompulzivní\\_porucha&oldid=444733](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Obsedantně_kompulzivní_porucha&oldid=444733)“