

# Chámovod

**Chámovod (*ductus deferens*)** tvoří hranice pokračování kanálku *cauda epididymidis* a při ejakulaci odvádí sperma do močové trubice. Průměr chámovodu je asi 3 mm, v proximální části je stočený, záhy rovný. Lumen chámovodu je úzké, asi **0,5 mm**, většina průměru totiž připadá na tloušťku svalové vrstvy stěny.

## Poloha a syntopie chámovodu

Od ocasu nadvarlete chámovod běží kraniálně po zadním okraji varlete, mediálně od těla nadvarlete. Nad *extremitas superior testis* se stane součástí **funiculus spermaticus** = semenný provazec, pokračuje do *canalis inguinalis*. Při průchodu v *canalis inguinalis* se chámovod s *a. ductus deferentis*, která jej provází, oddělí od zbylých struktur z *funiculus spermaticus*. Stáčí se kolem *a. epigastrica inferior*, překříží *vasa iliaca externa* a stáčí se ke vchodu do malé pánve. V malé pánvi kříží *chorda a. umbilicalis*, *vasa et n. obturatorius*, ureter, a stočí se k zadní straně močového měchýře. Probíhá mediálně od semenných váčků, s jejichž vývody se spojí ve vstřikovací kanálek (***ductus ejaculatorius***). **Vstřikovací kanálky** prostupují prostatou a ústí na **coliculus seminalis** močové trubice, v průběhu za *fundus vesicae* se chámovod rozšiřuje, má pokroucený tvar s meandrovitými výdutěmi. Toto rozšíření se označuje jako **ampulla ductus deferentis**, **trigonum interampullare** - prostor, který vymezují obě *ampullae ductus deferentis* na močovém měchýři, dobře hmatný per rectum

## Stavba stěny

### Tunica mucosa

Sliznice vytvářející podélné řasy (kromě ampulárního úseku - tam mají retikulární uspořádání). Kryta **cyklindrickým, dvouřadým epitelem**, složeným z cylindrických buněk (proximálně bez stereocilií, distálně se stereociliemi) a z bazálních buněk. V epitelu je velké množství sekretoricky aktivních buněk. *Lamina propria mucosae* - slabá vrstva řídkého kolagenního vaziva, které obsahuje mnoho elastických vláken.

### Tunica muscularis

Silná vrstva svaloviny, která se skládá ze 2 případně 3 vrstev hladkých svalových buněk. Rozlišujeme hlubší **cirkulární** a povrchnější **longitudinální** uspořádání svalových vláken. V proximální části se nachází i třetí longitudinální vrstva. Vrstvy jsou nepřesně ohraničené. Smrštěním zajišťuje **transport spermii** do močové trubice.

### Tunica adventitia

Tenká vazivová vrstva na povrchu, která přechází do vaziva funiculus spermaticus.

## Cévní zásobení

### Tepny

Přímo z *a. umbilicalis* nebo *a. vesicalis superior* odstupuje ***a. ductus deferentis***.

### Žíly

Odtékají do **plexus pampiniformis** a do **plexus venosus vesicalis** a **plexus venosus prostaticus**.

### Mízní cévy

Vedou do **nodii lymphatici iliaci externi et interni**.

### Inervace

Větévky **plexus deferentialis** přicházejí cestou **plexus hypogastricus inferior**. Obsahují vlákna sympatická (*nn. splanchnici lumbales*) a parasympatickou složku z míšních segmentů S<sub>2</sub>-S<sub>4</sub>.

## Odkazy


### Související články

- Vývodné cesty pohlavní u muže
- Provazec semenný


### Použitá literatura

- ČIHÁK, Radomír. *Anatomie 1*. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.

Citováno z „<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Chámovod&oldid=396284>“



Mužské pohlavní ústrojí



Histologie vas deferens