

Tubulointerstiální nefritidy

Tubulointerstiální nefritidy (TIN) jsou zánětlivá onemocnění, která postihují primárně renální tubuly a / nebo renální intersticium. Glomeruly bývají často postiženy také a to právě v důsledku postižení tubulů.

- **Pyelonefritidy** - starší souhrnný název, označuje ale spíše pouze nefritidy, na kterých se jasně podílí infekční agens (což rozhodně není u všech TIN).

Charakteristika TIN


Mezi projevy onemocnění patří:

- proteinurie různého stupně,
- erytrocyturie (obvykle neglomerulární),
- leukocyturie (u bakteriálních nebo tam, kde infekce nasedá sekundárně),
- dysurické potíže.

Akutní TIN

[[upravit vložený článek](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Akutn%C3%AD_tubulointersti%C3%A1ln%C3%AD_nefritidy&action=edit)] (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Akutn%C3%AD_tubulointersti%C3%A1ln%C3%AD_nefritidy&action=edit)

Mezi akutní **tubulointerstiální nefritidy** (TIN) patří především akutní bakteriální TIN a akutní hypersenzitivní TIN (a dále třeba parainfekční a idiopatická TIN). U těchto onemocnění bývá postižení ledvinných tubulů a intersticia. Typickým projevem onemocnění je proteinurie různé závažnosti a neglomerulární erytrocyturie.



Vzhled tubulů při interstiální nefritidě

Akutní bakteriální TIN

Akutní TIN vznikají často **na podkladu ascendentní infekce močových cest**. Pro vznik tohoto onemocnění mohou být jisté **predispozice**, které vznik těchto infekcí usnadňují:

- vrozené predispozice - vývojové anomálie (zdvojená ledvinová pánvička), vezikoureterální reflux (VUR);
- získané predispozice - lithiasa (močové kameny), hypertrofie prostaty, stenóza ureteru (například útlakem z okolí).

Mezi typické projevy tohoto onemocnění patří:

- systémové projevy - slabost, febrilie;
- bolest v bederní krajině;
- fyzikálně často pozitivní tapottement;
- dysurické potíže;
- možná je i oligourie.

Vyšetření

▪ Fyzikální vyšetření:

1. schvácenost, opocení, febrilie doprovázené často třesavkami
2. aktivní zaujímání úlevové polohy
3. pozitivní tapottement

▪ Vyšetření moči a močového sedimentu patří k základním:

1. leukocyturie - vždy,
2. bakteriurie - také by měla být vždy přítomna, pokud se nedaří průkaz bakterií, nutno zvážit možnost TBC infekce,
3. neglomerulární erytrocyturie,
4. proteinurie < 2 g/24 hod.

▪ Vyšetření krve - leukocytóza, zvýšené CRP a sedimentace,

- **Kultivační vyšetření** by mělo být provedeno vždy, kvůli citlivosti na ATB léčbu, typickými agens jsou *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, pokud se nedaří vykultivovat, nutno zvážit TBC infekci.
- **Ultrazvukové vyšetření** - typický obraz pro akutní bakteriální TIN je mapovitý vzhled ledviny.
- Biopsie ledvin není indikována.

Terapie

Akutní bakteriální TIN patří mezi onemocnění, která lze léčit ambulantně, je ale na místě zvážit možnost hospitalizace.

▪ ATB terapie,

1. necílená empirická,
2. cílená - na základě výsledku kultivačních testů na citlivost ATB.

Mezi používané preparáty patří cefalosporiny, aminoglykosidy a fluorochinolony (častá rezistence). Nutná délka trvání ATB terapie je **alespoň 2 týdny**. Je nutné pamatovat na to, že jeden z nežádoucích účinků užívání antibiotik je riziko vzniku renální insuficience (nikdy by zároveň s ATB léčbou neměl být podán furosemid, který je rovněž nefrotoxický a vzájemná kombinace léčiv by mohla vést k nevratnému poškození ledvin).

Akutní hypersenzitivní TIN

Jedná se o typ lékové alergie. V anamnéze je typické zjištění užívání **léčiva (ATB, NSAID)**, poté následuje **období latence** (až 6 týdnů), po kterém se rozvíjí příznaky. Na rozvoj onemocnění **nemá vliv dávka nebo délka užívání léčiv**.

- **Příznaky:**

1. febrilie,
2. kožní změny,
3. artralgie,
4. (dysurické obtíže nejsou, protože stav není vyvolán infekcí).

Vyšetření

- **Vyšetření moči:**


1. neglomerulární erytrocyturie,
2. eosinofilurie,
3. proteinurie různého rozsahu (< 2 g / 24 hod až nefrotický syndrom).

- **Vyšetření krve** - typická je eosinofilie.
- **Sonografie** - normální obraz ledvin.
- **Biopsie** - granulomy.

Terapie

Terapie spočívá v odstranění alergenu. Pokud to samotné nestačí, podávají se kortikosteroidy.

Chronické TIN

[ upravit vložený článek] (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Chronick%C3%A9_tubulointerstick%C3%A1ln%C3%AD_nefritidy&action=edit)

Mezi chronické tubulointerstickiální nefritidy patří především chronická bakteriální TIN, analgetická nefropatie a refluxová nefropatie. Mezi typické projevy onemocnění patří leukocyturie a bakteriurie (u infekčních), erytrocyturie (neglomerulárního původu), proteinurie různého rozsahu.

Chronická bakteriální TIN

Pacienti mají obvykle nějakou z predispozic (vrozené - zdvojená pánvička, nebo získané - lithiasa, hypertrofie prostaty), v anamnéze se objevují opakované epizody akutní bakteriální TIN s asymptomatickými mezidobími.

Příznaky

- **vyšetření moči,**

1. bakteriurie je obvykle přítomna, pokud nelze z moči vykultivovat žádný patogen a leukocyturie je přítomna, nutno zvážit možnost TBC,
2. leukocyturie je vždy přítomna,
3. neglomerulární erytrocyturie,
4. proteinurie - obvykle malá,

- **sono** - typické pozánětlivé změny a to nejenom ledvin (možné abscesy a nebo jejich pozůstatky), ale i vývodného systému.

Terapie

- **ATB terapie** u akutních exacerbací (jako u akutní TIN, empiricky, pak dle výsledků kultivace),
- při velmi častých exacerbacích se používá preventivní **noční dávka** ATB i v asymptomatických obdobích.

Refluxová nefropatie

Vzniká u pacientů, kteří trpí vesikoureterálním refluxem (VUR, vrozený defekt ureteru, který vede k refluxu moči z močového měchýře do ureteru). Na tomto podkladu vznikají recidivující infekce močových cest. Nejčastěji se vyskytuje u dětí, obecně platí, že v čím mladším věku se objevují recidivující močové infekce, tím je větší pravděpodobnost, že je to na podkladu VUR. Neléčený VUR III.-IV. stupně vede k refluxní nefropatii s častými recidivami. Hrozí vznik fokální segmentální glomerulosklerózy, hypertenze a v konečném důsledku i renálního selhání.

Příznaky

- časté infekce močových cest v anamnéze nebo zjištěný VUR,
- enuréza (noční pomočování) u dětí starších 5 let,
- **vyšetření moči,**

1. bakteriurie,
2. leukocyturie,
3. neglomerulární erytrocyturie,
4. proteinurie nefrotického typu (více než 4 g proteinu v moči za den, velmi těžký nálezn, obzvláště u dítěte),

- **mikční cystografie,**
- **scintigrafické vyšetření.**

Terapie

- ATB terapie při exacerbacích,

- **léčba VUR (chirurgická),**
- **léčba nefrotického syndromu** (terapie významné proteinurie, případných otoků, hypertenze a dyslipidémie).

Analgetická nefropatie

Analgetická nefropatie je důsledkem dlouholetého abúzu analgetika Fenacetinu (starší analgetikum, užívané zhruba v období před 30 lety, dnes už se nepoužívá). Typický pacient je tedy vyššího věku s anamnézou užívání Fenacetinu (například pro revmatologická onemocnění nebo jiné nemoci vyznačující se bolestivostí)

Renální projevy

- široké spektrum projevů:
 1. možný je i asymptomatický průběh,
 2. hematurie,
 3. renální kolika,
 4. renální selhání,
 5. hypertenze (jako důsledek renálního poškození).

Další důsledky

- zvýšené riziko vzniku karcinomu močových cest z přechodného epitelu,
- ostatní projevy analgetického syndromu (psychosomatické, kostní, kardiovaskulární, hematologické a gastrointestinální poruchy).

Klasifikace TIN

Tubulointersticiální nefritidy můžeme klasifikovat podle rychlosti vzniku, průběhu, reverzibility, etiologie a dalších. Nejčastější klasifikace je podle rychlosti vzniku na akutní a chronické.

| Klasifikace tubulointersticiálních nefritid | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutní tubulointersticiální nefritidy | Chronické tubulointersticiální nefritidy |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ akutní bakteriální TIN, ▪ akutní hypersenzitivní TIN (polékové, především ATB, NSAID), ▪ parainfekční TIN, ▪ idiopatické TIN. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ chronické bakteriální TIN, ▪ analgetická nefropatie, ▪ refluxová nefropatie, ▪ poléková nefropatie, ▪ otrava Li a těžkými kovy, ▪ postradiační nefropatie, ▪ nefropatie při systémových chorobách (při SLE nebo RA nemusí vznikat pouze glomerulonefritidy), ▪ nefropatie při maligních onemocněních, ▪ metabolická nefropatie, ▪ endemická balkánská nefropatie. |

Odkazy

Související články

- Vezikoureterální reflux
- Vyšetření moči
- Glomerulonefritidy

Použitá literatura

- ČEŠKA, Richard, et al. *Interna*. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 546-547. ISBN 978-80-7387-423-0.
- ČERTÍKOVÁ-CHÁBOVÁ, Věra. *Tubulointersticiální nefritidy* [přednáška k předmětu Nefrologie, obor všeobecné lékařství, 1. Lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 4.1.2011.

Externí dokazy

 MEFANET přednáška Tubulointersticiální nefritidy (<https://portal.lf1.cuni.cz/clanek-618-tubulointersticiální-nefritidy>)

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Tubulointersticiální_nefritidy&oldid=435483“