

Syndrom okcipitálního laloku



Je charakterizován zrakovou symptomatikou, jako jsou:

- **homonymní hemianopsie**,
- **korová slepota** při oboustranné lézi v oblasti fissura calcarina,^[1] optokinetický nystagmus je vymizelý, zachovalá je fotoreakce^[2]
- **fosfény** nebo **zrakové pseudohalucinace** vznikají při iritační lézi,
- **alexie**, **zraková agnózie** při lézi řečově dominantní hemisféry. ^[1].

Mezi nejčastější příčiny patří trombóza či embolie v oblasti aa. cerebri posteriores.^[2]

Odkazy

Související články

- Prefrontální syndrom
- Syndrom frontálního laloku
- Rolandický syndrom
- Syndrom parietálního laloku
- Syndrom temporálního laloku
- Funkční korové oblasti

Reference

1. AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie*. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
2. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Syndrom_okcipitálního_laloku&oldid=409178“