

# Procvičování: Patofyziologie vylučovacího systému/pokračování 14

1 Častou příčinou chronického renálního selhání je

- arteriální hypertenze
- diabetes mellitus
- chronická glomerulonefritida
- poúrazová jednostranná nefrektomie

2 Mezi typické příčiny chronického renálního selhání patří

- diabetes mellitus
- diabetes insipidus
- arteriální hypertenze
- arteriální hypotenze

3 Pro polycystické onemocnění ledvin platí

- často vede k chronickému selhání ledvin
- u tohoto stavu byly popsány polycytémie
- jde o geneticky podmíněné onemocnění
- postiženými nikdy nejsou ženy

4 Na vzniku renální osteopatie se podílí

- zvýšená sekrece parathormonu
- metabolická alkalóza typická pro renální insuficienci
- zvýšená aktivita vitamínu D v důsledku jeho kompenzační hyperaktivity v játrech
- hyperfosfatémie

5 Sekundární hyperparatyreóza

- je hypofysární onemocnění
- je důsledkem hypokalcémie
- je stav po chirurgickém odstranění příštítných tělísek
- patří do obrazu renální insuficience

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_vylu%C4%8Dovac%C3%ADho\\_sy st%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_13](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_vylu%C4%8Dovac%C3%ADho_sy st%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_13))

Zpět na obsah ([https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_patofyziologie](https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie))

Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_vylu%C4%8Dovac%C3%ADho\\_sy st%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_15](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_vylu%C4%8Dovac%C3%ADho_sy st%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_15))

Našli jste chybu? Napište!