

Odložená preparace

Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Caries profunda pulpae proxima je kaz pronikající sklovinou i dentinem až k pulpě. Nad pulpou je vrstvička dentinu, jež sice může být změkklá, demineralizovaná, ale není infikovaná. To znamená, že se nebarví caries detektorem. Uděláme tedy tzv. nepřímé překrytí. Jestliže bude tenká vrstvička infikovaná, pak se jedná o *caries ad pulpam penetrans* a děláme exstirpaci pulpy. Jedinou výjimku tvoří mladí, kteří nemají uzavřený vývoj kořene a kdy jim můžeme dát šanci i přes *caries ad pulpam penetrans* tzv. odloženou preparaci.

Diagnóza

Pacient nemá klinické příznaky irreverzibilního poškození pulpy:

- není spontánní bolest
- není přetrvávající bolest

Léčba

U těchto lidí uděláme preparaci, která jde do blízkosti pulpy, ponecháme infikovaný kousek dentinu, dáme přes něj GIC a pošleme pacienta pryč na 6-9 měsíců.

Mezitím by se měl vytvořit terciální dentin. Kde je to možné, tak to zremineralizuje. V příští návštěvě (po zhruba třičtvrtě roce) odstraníme GIC a dáme tam definitivní výplň.

Jde to pouze u mladých zubů a u zdravé pulpy. Nedáváme tam Ca(OH)_2 , protože ten se neuplatní při remineralizaci. Ca(OH)_2 se uplatní pouze jako dezinficiens, možná mírně lepší pH pulpy.

Ale jestliže zub nemá žádné příznaky, tak tam radši dám Fuji VII (Triage, chem. tuhnoucí), jež má mnohem lepší mineralizační schopnosti. Avšak není chybou dát tam Ca(OH)_2 , ale rozlišení, kdy ho dát a kdy ne, je spíš dané stavem pulpy. Když by byl v pulpě počínající zánět, tak ho spíš dáme.

Odkazy

Související články

- Testy vitality zubu
- Zubní kaz

Zdroj

- PEŘINKA, Luděk. *Ošetření zubního kazu* [přednáška k předmětu Konzervační zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. letní semestr 2011.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Odložená_preparace&oldid=455265“