

Münchhausenův syndrom

Münchhausenův syndrom (tzv. **syndrom Barona Prášila**) je duševní porucha. Patří do skupiny tzv. *faktitivních* (předstíravých) poruch.

Podstatou syndromu je předstírání somatických či psychických obtíží, jehož **účel není jasný**. Nejčastěji se interpretuje jako jednání s cílem získat roli nemocného a kontakt se zdravotnickým personálem.

Epidemiologie

Z hlediska četnosti jde spíše o **vzácné případy**. Ve světové literatuře jsou popsány jednotlivé kazuistiky, několik takových případů se vyskytlo i v České republice.

Příznaky

Může se projevit **celou škálou příznaků** - od pouhého předstírání bolesti až po přímé navozování chorobných příznaků, které mohou mít letální následky. Typické je obcházení různých zdravotnických zařízení s rozličnými problémy, které nejsou jasně vysvětlitelné provedeným vyšetřením. K předstírání může pacient použít např. přidávání krve do moči, vbodávání jehel do těla, aplikaci nečistot či dokonce fekálií do žíly.

Terapie

Terapie není jednoduchá. Porucha má tendenci chronifikovat. Významné jsou psychoterapeutické a farmakoterapeutické přístupy, přičemž léčbu by měl vést zkušený psychiatr. Problémem bývá absence náhledu na potřebnost léčby.

Diferenciální diagnostika

- Nejprve je nutné vyloučit somatické onemocnění.
- Od simulace se porucha odlišuje tím, že nemá přímý vědomý účel.
- V úvahu přichází psychotické onemocnění schizofrenního okruhu, zde by se však symptomy spojily se zřejmou poruchou myšlení či vnímání.

Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení)

Je variantou v pediatrii, kdy **pečující osoba** (nejčastěji matka) předstírá, zesiluje nebo **navozuje obtíže u dítěte**, pro které pak vyhledá lékařskou pomoc a dožaduje se diagnostické a terapeutické intervence.

Typické znaky

- Porucha u dítěte je multisystémová, dlouhotrvající, neobvyklá nebo vzácná.
- Symptomy jsou nepřiměřené nebo inkongruentní.
- Symptomy mizí, nejsou-li rodiče/rodič přítomni.
- V rodině se vyskytuje syndrom náhlého úmrtí kojence.
- Dítě reaguje neobvyklým způsobem na terapii.
- Rodič je úzce připoután k dítěti a má medicínské znalosti.
- Rodič vyžaduje od zdravotnického personálu další vyšetřování dítěte.

Terapie

Je nutné zabránit poškozování dítěte! Často jsou nezbytná i úřední opatření ve smyslu odnětí dítěte z výchovy. Pokud došlo k porušení zdraví dítěte, měly jednotlivé případy i trestněprávní dohru. Jsou známy též případy končící smrtí.

Odkazy

Související články


- Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)

Externí odkazy

- Epizoda seriálu Lékařští detektivové popisující drsný případ Münchhausenova syndromu v zastoupení (<https://www.youtube.com/watch?v=emqL-qF4p7E>)
- Münchhausenův syndrom na anglické Wikipedii (https://en.wikipedia.org/wiki/Munchausen_syndrome)
- Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen (https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen)

Použitá literatura

- LEBL, Jan. *Klinická pediatrie*. 1. vydání. Praha : Galén, c2012. 698 s. s. 653-654. ISBN 9788072627721.



Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba

