

Tanatorický dwarfismus

- **Tanatorický dwarfismus** (tanatorická dysplázie) je nejčastější **letální forma trpaslictví**, je způsoben různými mutacemi v genu *FGFR3*.
- porucha enchondrální osifikace, často se sdružuje s malformacemi kardiovaskulárního aparátu a centrálního nervového systému
- děti mají velkou hlavu, někdy s kraniofaciální disproporcí (tzv. *syndrom jetelíčkovité lebky* - má tvar trojlístku), platyspondylie obratlů
- krátké končetiny a žebra s nápadným zúžením a zkrácením hrudníku (následkem je ARDS)
- femury mívají tvar telefonního sluchátka
- diferenciální diagnóza: achondroplázie

Tanatorický dwarfismus



Klasifikace a odkazy

MKN-10	<u>Q77.1</u>
OMIM	<u>187600</u> , <u>187601</u>
orphanet	<u>628</u>



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům a jej.
O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

Odkazy

Související články

- [Achondroplázie](#)
- [Diastrofický dwarfismus](#)

Použitá literatura

- DUNGL, P., et al. *Ortopedie*. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. [ISBN 80-247-0550-8](#).