

Luxace pately

Etiologie

- trauma / vrozená dispozice (častěji ♀, i opakované habituální luxace)
- patela se luxuje většinou laterálně
- příčinou lat. luxace téměř vždy vrozená dispozice: valgozita kolene, vysoký stav česky (patella alta), vrozená dysplázie pately, syndrom kloubní hyperlaxity aj.

Diagnostika

- **akutní luxace:** výrazná změna kontury kolene + blokáda pohybu v semiflexi, haemarthros
- **recidivující luxace:** anamnéza opak. luxací pately, kongenit. dispozice, sy kloubní hyperlaxity, klinicky subluxace až luxace pately (vyšetřitelná spíše v CA)
- RTG - vyloučení přídružené zlomeniny, ev. CT
- ASK - nejpřesněji objasní stav kloubních ploch + postavení pately



rtg snímek luxované pately

Léčba

- repozice v CA, imobilizace kolene na 4-6 týdnů
- při recidivujících luxacích operace - medializace pately otevřeně / artroskopicky (+ laterální release)

Odkazy

Související články

- Patella
- Zlomeniny česky

Použitá literatura

- GALLO, Jiří, et al. *Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult.* 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2486-6.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Luxace_pately&action=history) a doplnit (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Luxace_pately&action=edit) jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Luxace_pately&oldid=335211“